

CISTITIS NO COMPLICADA EN LA MUJER

¿ESTA JUSTIFICADA LA PRESCRIPCIÓN DE FOSFOMICINA 3GR 2 SOBRES?

NO

DEFINICIÓN

Infección bacteriana aguda aislada o recurrente del tracto urinario inferior en mujeres no embarazadas y sin anomalías estructurales o funcionales subyacentes ni comorbilidades crónicas.

MICROORGANISMOS FRECUENTES

Escherichia coli 70%, *Klebsiella spp*,
Proteus spp, *Enterococo spp*.

EL DIAGNÓSTICO ES CLÍNICO

La presencia de más de 2 síntomas de los siguientes:
disuria, polaquiuria, urgencia miccional, hematuria dolor suprapúbico en ausencia de síntomas vaginales.

NO HACER

Tira de orina.
Urocultivo.

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

Incremento en la ingesta de líquidos.
Micción postcoital.
Evitar uso de espermicidas.
Mejorar la higiene perianal.



TRATAMIENTO

Fosfomicina 3 gr sobre dosis única.

ALTERNATIVA

Nitrofurantoina 100mg/8h durante 5 días.

¿POR QUÉ UN SOBRE?

Porque no se metaboliza, se excreta sin modificar en orina durante más de 7 días y mantiene concentraciones superiores a la CMI* durante 3 días.

*Concentración Mínima Inhibitoria

MÓDULO PRESCRIPCIÓN MEDORA

Prescripción
FOSFOMICINA-TROMETAMOL 3000 MG/SOB | SOBRES | SUSPENSION | ORAL

POSOLÓGIA

1 SOBRES cada 48 Horas durante 2 Días

Fecha de prescripción: 14/06/2023
Fecha de inicio de tratamiento: 14/06/2023
Fecha fin: 15/06/2023
Envases por receta: 1

LA RESISTENCIA ANTIBIÓTICA

Plan Nacional Resistencia Antibióticos

El uso incorrecto de los antibióticos supone un riesgo para todos nosotros.